

The background features a dark blue gradient with faint, light blue technical diagrams. On the left, a large circular scale with numerical markings from 140 to 260 is visible. Several circular diagrams with arrows and dashed lines are scattered across the page, suggesting a technical or scientific context.

TRATTAMENTO DELLA SECCHENZA OCULARE CON LUCE PULSATA IRPL

LUCA VIGO

CENTRO OFTALMO-CHIRURGICO CARONES

MILANO

IRPL: INDICAZIONI

- SENSAZIONE DI OCCHIO SECCO CON SCARSA OD ECCESSIVA LACRIMAZIONE
- BLEFARITI E BLEFAROCONGIUNTIVITI CRONICHE
- ALTERATA FUNZIONALITA' GHIANDOLE DI MEIBOMIO

IRPL: INDICAZIONI

- SOGGETTI CON:
- INFIAMMAZIONI CRONICHE CON UTILIZZO CICLICO E PROLUNGATO DI CORTICOSTEROIDI E SOSTITUTI LACRIMALI
- DISFUNZIONI ORMONALI, METABOLICHE ED IMMUNITARIE CHE RIGUARDANO LE ghiandole ESOCRINE E L' APPARATO CUTANEO A LIVELLO PALPEBRALE (DERMATITI SEBORROICHE, DERMATITI ATOPICHE CON INTERESSAMENTO DEL BORDO PALPEBRALE)

IRPL: ESAMI DIAGNOSTICI

- IMPORTANTE ANAMNESI ANCHE SU SITUAZIONE SISTEMICA
- OSDI
- AcuTarget (OQAS)
- INFLAMMA DRY TEST
- TEAR LAB: OSMOLARITA'
- VALUTAZIONE ghiandole di Meibomio
- VALUTAZIONE FILM LIPIDICO
- BUT

IRPL: TRATTAMENTO

- INFORMARE IL PAZIENTE:
 - POSSIBILI VANTAGGI
 - IMPORTANZA DEL NUMERO E TEMPISTICA DELLE SEDUTE
 - SINTOMATOLOGIA POST TRATTAMENTO/EFFETTO CUMULATIVO
 - PAGAMENTO A SEDUTA O PACCHETTO COMPRENSIVO DI 3 O 4 SEDUTE
 - DURATA DEL RISULTATO ED EVENTUALE NECESSITA' DI UN'ALTRA SEDUTA DOPO CIRCA 6 MESI PER RAFFORZARE I BENEFICI

IRPL: TRATTAMENTO

- PAZIENTE SUPINO
- PREPARAZIONE DA PARTE DI INFERMIERE CON CUFFIA E APPLICAZIONE GEL
- ESECUZIONE DA PARTE DEL MEDICO OCULISTA

IRPL: CASISTICA

- 169 TRATTAMENTI EFFETTUATI
- 61 PAZIENTI
- 43 PAZIENTI CON CICLO DI ALMENO 3 SEDUTE
- 7 PAZIENTI HANNO RINUNCIATO DOPO 1 O 2 SEDUTE

IRPL: NOSTRA CASISTICA

- VALUTAZIONE DOPO UN MESE DA ULTIMO TRATTAMENTO:
 - 70% PAZIENTI MOLTO SODDISFATTI
 - 85% PAZIENTI SODDISFATTI
 - 15% PAZIENTI CON SCARSO RISULTATO SOGGETTIVO E/O OGGETTIVO

IRPL: VALUTAZIONE POST TRATTAMENTO

- OSDI
- AcuTarget
- INFLAMMA DRY TEST
- TEAR LAB: OSMOLARITA'
- VALUTAZIONE ghiandole di Meibomio, film lipidico e BUT

- SPESSORE DELL'EPITELIO CORNEALE

IRPL: VALUTAZIONE POST TRATTAMENTO

- PAZIENTE SODDISFATTO:
 - RIDUZIONE VALORE OSDI
 - RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DEL VALORE DI OSMOLARITA'
 - INFLAMMA DRY NEGATIVO

IRPL: VALUTAZIONE POST TRATTAMENTO

- PAZIENTE SODDISFATTO:
 - NON NECESSITA PIU' DI TERAPIA CORTICOSTEROIDEA
 - MINOR UTILIZZO DI SOSTITUTI LACRIMALI
 - SENSAZIONE DI BENESSERE PROLUNGATO

IRPL: VALUTAZIONE POST TRATTAMENTO

- PAZIENTE CON SCARSO BENEFICIO:
 - VALORI POST TRATTAMENTO INVARIATI
 - SOGGETTIVAMENTE POCO SODDISFACENTE
 - INADEGUATO SCREENING PRE?

IRPL: CONCLUSIONI

- TRATTAMENTO EFFICACE E SICURO
- FACILE DA PROPORRE E DA ESEGUIRE
- RISULTATI MOLTO SODDISFACENTI
- PARAMETRI PRE E POST TRATTAMENTO DA VALUTARE PER ULTERIORE OTTIMIZZAZIONE DELLA PROCEDURA